

PRECAUCIONES DE USO

Evite el contacto con los ojos y la piel.

No ingiera el producto.

Utilice guantes de goma y prendas de trabajo protectoras para su aplicación.

Cambie su ropa y lávese con agua y jabón después de la aplicación.

Lave sus manos antes de comer, beber, fumar o ir al baño, y después de la manipulación del producto. **NO ES TÓXICO PARA ABEJAS, PECES Y AVES. NO INFLAMABLE- NO CORROSIVO- NO TÓXICO.**

FRASES DE ADVERTENCIA: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR JUNTO CON ALIMENTOS. EN CASO DE INGESTIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO. MANTENER ENTRE 15°C - 30°C, PROTEGIDO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA Y HUMEDAD.

En caso de emergencia llamar a:

CITUC TOXICOLÓGICO : (2) 2635 3800

CITUC QUÍMICO: (2) 2247 3600

FitoBac FT®

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

APTITUD: BIOCONTROLADOR

XXX es un plaguicida biológico (biocontrolador) en formato líquido, formulado en base a una alta concentración de moléculas bioactivas producidas por *Bacillus velezensis* que tienen efecto *knock down* sobre hongos fitopatógenos.

COMPOSICIÓN

Lipopéptidos producidos por *Bacillus velezensis*..... 1%p/v
Coformulantes csp99% p/v

Ausencia de *E.coli* y *Salmonella*
pH: 8

Densidad: 1.06 g/cm³ a 20°C

Fecha de elaboración: 12.02.24

Fecha de vencimiento: 12 meses a partir de la fecha de elaboración.

Fabricado por:



Exacta Bioscience Spa.

Fundo Santa Paulina s/n,

Los Gomereros, Rengo.

www.exactascience.com

PRESENTACIÓN

Envase conteniendo 0,5 L

RECOMENDACIONES DE USO

Puede utilizarse como producto preventivo y/o curativo para el control de enfermedades causadas por *Pseudomonas syringae* pv. *actinidae*, *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*, *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum*, (cáncer bacterial, savia naranja del kiwi, tizón de la flor).

Agite antes de usar. Mida y diluya la cantidad indicada del producto a utilizar según la siguiente tabla, y aplique vía foliar.

Cultivo	Dosis
Carozos (Cerezo, Ciruelo, Durazno, Nectarín)	2 L/ha
Kiwi	2 L/ha

Una vez abierto el envase, utilice todo el contenido. Por precaución, no entrar ni permitir la entrada de trabajadores en las zonas tratadas por 4 horas tras la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No presenta riesgo de fitotoxicidad ni período de carencia. Al ser un producto biológico está exento de tolerancia de residuos. La aparición de sedimentos en el bidón no implica el deterioro del producto. Producto incompatible con antibióticos y productos cúpricos.



CUIDADO

